

リチウムキット

エスパ・Li II

体外診断用医薬品
自己認証番号 27A2X00166000024

リチウム製剤は、躁病や躁うつ病の躁状態の治療薬として広く使用されています。しかし、リチウムの有効濃度域は狭く、過剰量を投与された場合はリチウム中毒に至る可能性があります。中毒の初期症状としては、食欲低下、嘔吐、下痢等の消化器症状、振戦、眠気、無気力、錯乱等の中枢神経症状、運動障害、運動失調、発熱、発汗等を示すことがあり、さらに中毒が進むと、急性腎不全により電解質異常が現れ、全身痙攣、ミオクロヌス等がみられることが報告されています。リチウムの毒性は血中リチウム濃度と密接な関係にあり、投与に際しては、中毒予防の為に、血中リチウム濃度測定によるモニタリングが必要とされています。エスパ・Li IIは従来法をさらに発展させた汎用自動分析装置に対応した試薬です。

特 長

- ① F28テトラフェニルポルフィリンを主成分としました。
- ② 検体希釈が不要になりました。
- ③ 汎用自動分析装置に対応できます。
(対応機種については弊社までお問い合わせください)
- ④ 開封後の安定性が向上しました。

(資料請求先) 製造販売

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号